



O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE CAMPUS SOROCABA

Residência UniProfissional em Saúde 2022

ENFERMAGEM PEDIÁTRICA

Instruções:

- A duração da prova é de 2h30min, devendo o candidato permanecer na sala por, no mínimo, 1h30 minutos.
- A prova contém 40 questões objetivas, cada uma com 4 alternativas, das quais apenas uma é correta.
- Assinale na folha ótica de respostas a alternativa que julgar correta, preenchendo com caneta esferográfica (azul ou preta), com traço forte, dentro do espaço. Evite amassar ou rasurar.
- Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta assinalada na folha ótica. Também não serão computadas aquelas respostas com emenda ou rasura, ainda que legíveis, assinaladas com traço fraco ou branco.
- Desligue o celular, similares e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e coloque-os no envelope designado para este fim.
- Não é permitido o uso de relógios, seja digital, de pulso, com calculadoras ou outros. Coloque-o no envelope também.
- Será excluído da seleção o candidato que lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova.
- Ao término da prova o candidato deverá obrigatoriamente devolver ao fiscal este caderno de questões e a folha ótica de respostas.

Nome Completo

CPF

Assinatura

QUESTÃO 01

Os marcos de referência da Política Nacional de Saúde que fundamentaram a criação do Sistema Único de Saúde foram a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde que aconteceu no Cazaquistão e a 8ª Conferência Nacional de Saúde que aconteceu em Brasília. No entanto:

- A) a primeira influenciou a segunda.
- B) ambas foram influenciadas pelo Relatório Dawson do governo inglês.
- C) a segunda influenciou a primeira.
- D) ambas foram influenciadas pela I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Otawa.

QUESTÃO 02

Considerando os conceitos abaixo:

- I. trabalho e moradia dignas, alimentação e educação plenas, lazer, repouso, segurança e transporte adequado para todos, ambientes saudáveis, participação na gestão dos serviços de saúde, liberdade, acesso aos serviços de saúde.
- II. responsabilidade do estado na adoção de políticas sociais e econômicas que melhorem as condições de vida, na garantia de um sistema de saúde de acesso igualitário e universal, na normatização e controle das ações de saúde do setor público e privado.

É possível afirmar que:

- A) I reporta-se ao conceito amplo de saúde; II reporta-se à noção de saúde como direito.
- B) I e II reportam-se à noção de saúde como direito.
- C) I e II reportam-se ao conceito amplo de saúde.
- D) I reporta-se à noção de saúde como direito; II reporta-se ao conceito amplo de saúde.

QUESTÃO 03

Para produzir mudanças de gestão e de atenção à saúde é fundamental dialogar com as práticas e concepções vigentes e problematizá-las. Esta afirmação se apoia:

- A) na valorização dos saberes individuais e coletivos dos profissionais de saúde assim como das pessoas do território em que atuam.
- B) em se considerar como meta as experiências em gestão vigentes na instituição e que atendem ao planejamento institucional.

- C) na continuidade das ações em saúde e da gestão do processo de trabalho.
- D) no levantamento dos entraves do processo de trabalho em saúde identificados no território adstrito.

QUESTÃO 04

Aponte o conjunto correto das respostas: I - A saúde faz parte da seguridade social. II - A previdência e assistência social fazem parte da seguridade social. III - O trabalhador assim como o desempregado tem direito à seguridade social. IV - Previdência social está relacionada a necessidade de contribuição para garantir direitos ao cidadão.

- A) Apenas II e IV estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas I e IV estão corretas.
- D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 05

A Santa Casa da cidade SORRISO cujo atendimento é 95% SUS está com problemas financeiros e deve a fornecedores. A Secretaria de Saúde do Estado diz em nota que reconhece que deve R\$ 10 milhões aos hospitais filantrópicos e que está negociando com Brasília repasses adicionais para fazer esse pagamento. Em nota, o Ministério da Saúde esclarece aos jornalistas que não repassa recursos para nenhum hospital. Como entender a declaração?

- A) A responsabilidade da situação do hospital é de seus gestores que necessitam rever seu orçamento com aprovação prévia dele.
- B) O município é o gestor responsável pelas negociações com o ministério da saúde.
- C) Para haver o repasse de dinheiro o gestor do hospital deve ser funcionário da secretaria de saúde da cidade.
- D) Os recursos financeiros para o SUS são pactuados entre os três níveis (união, estados e municípios) e sob aprovação orçamentária.

QUESTÃO 06

Em relação às afirmações abaixo responda:

- I. As etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) coincidem com todas as etapas do método científico.
- II. Para se realizar a intervenção de enfermagem (execução do plano terapêutico de enfermagem) é imprescindível ter o diagnóstico de enfermagem.
- III. O exame clínico de enfermagem é atribuição legal e exclusiva do enfermeiro.
- IV. A realização da SAE não exige que o enfermeiro tenha como referência uma teoria de Enfermagem.

- A) Há apenas duas afirmativas corretas.
- B) Há duas alternativas parcialmente corretas.
- C) Há três alternativas incorretas.
- D) Há três alternativas corretas.

QUESTÃO 07

O exame físico representa um instrumento de grande valia para a assistência, uma vez que permite ao enfermeiro realizar o diagnóstico e planejar as ações de enfermagem, acompanhar e avaliar a evolução do paciente. Sobre o exame físico na pessoa idosa é incorreto afirmar que:

- I. Dada a sua especificidade são necessários equipamentos especiais para sua realização e sempre solicitar a presença de um acompanhante.
- II. Nos idosos o exame físico deve incorporar, além da avaliação clínica, a avaliação de limitações para as atividades de vida diária, alterações cognitivas, perda de peso e depressão.
- III. Deve estar atento as alterações próprias da senescência, considerando o seu modo de viver.
- IV. Deve ser realizado no nível ambulatorial, para avaliação das condições de saúde do idoso, não sendo fundamental sua realização nos pacientes hospitalizados.
- V. Deve ser considerada as suas limitações e respeitar a sua individualidade.

- A) I e IV.
- B) II e III.
- C) I e V.
- D) II e IV.

QUESTÃO 08

Na Visita Domiciliária ao idoso, durante uma consulta de enfermagem baseada na Teoria de enfermagem de Orem, o enfermeiro deverá enfatizar:

- A) Nas necessidades humanas básicas determinando o grau de dependência.
- B) Na relação enfermeiro-pessoa visando o atendimento pessoal, interpessoal e social.
- C) Nos déficits do auto-cuidado baseado nos requisitos universal, de desenvolvimento e desvio de saúde.
- D) Na classificação do perfil epidemiológico das famílias segundo o modo de produção e reprodução social.

QUESTÃO 09

Sobre a Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento, assinale a alternativa correta:

- A) A Saúde do Idoso aparece como uma das prioridades no Pacto pela Vida, mantendo a preocupação histórica com a saúde da população idosa brasileira nas políticas públicas do Brasil.
- B) De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são 30,2 milhões de idosos, 4,8 milhões a mais do que em 2012. Isso representa um aumento de 18% na quantidade de pessoas acima dos 60 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2030, o número de idosos deverá ser reduzido.
- C) Os agravos decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis têm sido as principais causas de óbito na população idosa, seguindo uma tendência mundial. Quando são analisadas as causas específicas, a doença cerebrovascular ocupa o primeiro lugar em mortalidade no país, tanto em idosos quanto na população geral, e as doenças cardiovasculares, o segundo lugar.
- D) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, apenas para recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

QUESTÃO 10

A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível (DCNT) definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ou medicamentoso) superam os riscos. Trata-se de uma condição multifatorial, que depende de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais (Diretrizes Brasileiras de HÁ, 2020). É considerado hipertensão arterial os indivíduos com mais de 18 anos, cuja pressão arterial foi medida com a técnica correta, em pelo menos duas ocasiões diferentes e na ausência de medicação anti-hipertensiva:

- A) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg.
- B) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 mmHg e pressão arterial diastólica maior ou igual a 100 mmHg.
- C) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 mmHg e pressão arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg.
- D) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e pressão arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg.

QUESTÃO 11

O consumo de cigarros por pessoas com diabetes influencia negativamente o controle dessa doença e contribui para o estabelecimento de complicações, embora os mecanismos envolvidos nesses processos ainda não tenham sido completamente esclarecidos (SBD, 2019-2020). Assinale a alternativa correta em relação as afirmações:

- I. O tabaco associado ao DM tem maior risco para desenvolvimento de neuropatia periférica, pé diabético e insuficiência renal.
- II. A suspensão do tabaco pode resultar na melhora do perfil lipídico, com elevação do colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e redução do colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-c).
- III. Os dados populacionais não comprovaram que o abandono ao tabagismo houve perdas ponderais significativas.
- IV. Intervenções motivacionais e cognitivo-comportamentais, isoladamente ou associadas a farmacoterapia, elevam significativamente as chances de abandono do tabagismo em acompanhamentos de médio prazo.

- A) As afirmações I, II e IV são verdadeiras e III é falsa.
- B) As afirmações I e IV são verdadeiras e II e III são falsas.
- C) As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são falsas.
- D) As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é falsa.

QUESTÃO 12

O comprometimento ocular do paciente diabético, caracterizado muitas vezes, por cegueira total, é uma das consequências mais temidas pelo paciente. Pode tomar forma de retinopatia diabética caracterizada por espessamento dos capilares retinianos, microaneurismas, e edema retiniano. Como o enfermeiro pode avaliar essa importante complicação no paciente diabético?

- A) Presença de escotomas.
- B) Diminuição do campo visual.
- C) Diminuição da acuidade visual a testes simples.
- D) Hemorragia intra-ocular.

QUESTÃO 13

Neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes, compreendendo um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximais ou distais, de instalação aguda ou crônica, de caráter reversível ou irreversível, manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos dramáticos. Sobre a Neuropatia podemos afirmar:

- I. Nos casos de neuropatia simétrica sensitivomotora distal pode se manifestar por sensação de formigamentos, dormência e parestesia que se inicial no sentido distal e se deslocar no sentido proximal.
- II. A neuropatia diabética é complicação microvascular associada com morte prematura por uremia ou problemas cardiovasculares.
- III. Na neuropatia autonômica pode se manifestar por taquicardia em repouso e hipotensão ortostática.
- IV. Também é observado risco aumentado por infecção no trato urinário devido a bexiga neurogênica, anidrose, disfunção erétil.

- A) As alternativas I, II e IV estão corretas.
- B) As alternativas II, III e IV estão corretas.
- C) As alternativas I, III e IV estão corretas.
- D) As alternativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 14

Sobre a transmissibilidade do SARS-COV-2 é correto afirmar:

- I. Durante o período "pré-sintomático", algumas pessoas infectadas podem transmitir o vírus, o que ocorre, em geral, a partir de 48 horas antes do início dos sintomas.
- II. O SARS-CoV-2 é transmitido principalmente por pessoas sintomáticas e sua concentração é mais alta no trato respiratório superior, principalmente a partir do terceiro dia após o início dos sintomas.
- III. Os resultados de testes de PCR podem apresentar-se positivos para SARS-CoV-2 desde os primeiros sinais e sintomas.
- IV. Um caso assintomático caracteriza-se pela confirmação laboratorial do SARS-CoV-2 em um indivíduo que não desenvolve sintomas.

- A) Estão corretas as afirmações I e II somente.
- B) Estão corretas as afirmações I e III somente.
- C) Estão corretas as afirmações I, II e III somente.
- D) Estão corretas as afirmações I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

Durante avaliação do paciente com suspeita de Dengue em monitoramento na UBS, a equipe de enfermagem deve estar atenta as seguintes manifestações de sinais de alarme:

- A) Dor abdominal intensa, febre com duração máxima de 7 dias, edema, prurido e sinais hemorrágicos.
- B) Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hemorragias importantes, sonolência ou irritabilidade, desconforto respiratório e hipotermia.
- C) Febre com duração mínima de 2 dias, aumento de diurese e tosse.
- D) Febre com duração mínima de 7 dias, mialgias, artralgias e gengivorragias espontâneas.

QUESTÃO 16

No contexto das arboviroses no Brasil, a prova do laço tem como objetivo buscar manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas e deve ser:

- A) É sempre importante, mas contraindicada em pacientes obesos e em crianças de qualquer idade.
- B) Deve ser repetida no acompanhamento clínico do paciente, independente do resultado da prova anterior.
- C) Deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo.
- D) Deve ser realizada na triagem e será positiva se houver aproximadamente 15 petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças.

QUESTÃO 17

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, tendo se tornado, nos últimos anos, uma epidemia no Brasil. Nesse contexto, em relação a esta doença, marque a alternativa CORRETA:

- A) Os testes treponêmicos detectam anticorpos específicos produzidos contra os antígenos de *T. pallidum*, são reagentes logo no primeiro contágio da doença e permanecem reagentes por toda vida, mesmo após o tratamento.
- B) A primeira manifestação é caracterizada por "cancro duro", caracterizada por úlcera geralmente única, indolor, com base endurecida e fundo limpo, sendo rica em treponemas. Surge em média entre 8 e 12 semanas após a infecção e desaparecem espontaneamente, independentemente de tratamento.
- C) Os testes rápidos para detectar Sífilis são práticos e de fácil execução, com leitura do resultado após 2 horas.
- D) A penicilina é o medicamento de escolha para o tratamento da Sífilis. Seu esquema terapêutico é: Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI, IM, semanal, por 3 meses.

QUESTÃO 18

A testagem para a infecção pelo HIV por meio dos testes rápidos (TR) possibilitou a sua realização em ambientes laboratoriais e não laboratoriais, permitindo ampliar o acesso ao diagnóstico. Sobre os TR é correto afirmar:

- I. São desenvolvidos para detectar anticorpos anti-HIV em até 30 minutos.
 - II. Os dispositivos são otimizados para acelerar a interação antígeno/anticorpo.
 - III. Podem ser realizados com amostras de sangue total colhidas por punção digital ou venosa (pag 62 manual 2020).
 - IV. Podem ser realizados por profissionais da saúde.
- A) Estão corretas somente as afirmativas I e II.
B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV.
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III.
D) Estão corretas somente as afirmativa II, III e IV.

QUESTÃO 19

As hepatites virais são causadas por diferentes agentes etiológicos, que têm em comum o tropismo primário pelo tecido hepático. São de grande importância para a saúde pública, em razão do número de pessoas acometidas, transmissibilidade, cronicidade e potencial para complicações.

- I. A hepatite viral B é uma infecção de transmissão parenteral, percutânea, pela via sexual e vertical.
- II. As infecções causadas pelo HBV na forma aguda, cerca de 70% dos casos apresentam a forma subclínica e 30% a forma icterícia, evoluindo para forma mais grave da doença.
- III. O vírus da hepatite A (HAV) é transmitido predominantemente por via parenteral
- IV. A hepatite C é uma infecção de transmissão principalmente parenteral, de evolução silenciosa e muitas vezes, diagnosticada décadas após a infecção.
- V. A hepatite A não evolui para doença crônica e é por meio da vacinação a sua principal forma de controle.
- VI. O risco de infecção pelo HCV está aumentando em determinadas populações, como usuários de drogas intravenosas ou usuários de cocaína inalada que compartilham os equipamentos de uso, e atendentes de consultórios odontológicos, podólogos, manicures, que não obedecem às

normas de biossegurança e expõem-se a sangue pela via percutânea.

Escolha a alternativa correta:

- A) Somente a I e II estão incorretas.
B) Somente a III está incorreta.
C) Somente a IV está incorreta.
D) Somente a VI está incorreta.

QUESTÃO 20

Os eventos adversos decorrentes da vacinação contra a tuberculose são decorrentes de falhas de administração da vacina, como:

- I. aplicação via intradérmica.
- II. utilização de vacina diluída até 4 horas.
- III. aplicação via subcutânea.
- IV. aplicação de dose com volume de 1 mL.

Estão corretas somente as afirmações:

- A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) III e IV.

QUESTÃO 21

No final de 2019, o Ministério da Saúde divulgou novidades para o Calendário Vacinal 2020 e que estavam em vigor no ano de 2021. Entre as mudanças, estavam incluídas alterações para o esquema de vacinação contra **Febre Amarela**, que de acordo com o Ministério da Saúde:

- A) será ofertada como reforço a partir dos 15 anos de idade e depois a cada 10 anos.
B) será oferecida a pessoas de 5 a 59 anos de idade que nunca foram vacinados ou sem comprovante de vacinação (uma dose).
C) será obrigatória para funcionários que ingressarem no serviço público.
D) será ofertada como reforço, após a dose inicial, aos 9 anos e a cada 10 anos, em áreas de transmissão endêmica da doença

QUESTÃO 22

Quanto ao Calendário de Vacinação 2020/2021 preconizado pela Sociedade Brasileira de Imunização, na proteção ao Papiloma Vírus Humano (HPV2 e HPV4), marque a opção **CORRETA**.

- A) A vacina HPV2 e HPV4 deverá ser aplicada na faixa etária de 11 a 14 anos para meninas e meninos. Seu esquema compreende aplicação de 2 doses com intervalo de 6 meses.
- B) A vacina HPV2 e HPV4 deverá ser aplicada na faixa etária de 11 a 14 anos para meninas e meninos. Seu esquema compreende aplicação de 2 doses com intervalo de 2 meses.
- C) A vacina HPV2 e HPV4 deverá ser aplicada na faixa etária de 09 a 14 anos para meninas e meninos. Seu esquema compreende aplicação de duas doses com intervalo de 6 meses.
- D) A vacina HPV2 e HPV4 deverá ser aplicada na faixa etária de 09 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 anos para meninos. Seu esquema compreende aplicação de duas doses com intervalo de 6 meses.

QUESTÃO 23

A vacina Tríplice Viral trata-se de vacina atenuada, contendo vírus vivos atenuado do sarampo, da rubéola e da caxumba. Sobre a vacina, considere a alternativa incorreta:

- A) A primeira dose deve ser administrada aos 12 meses.
- B) Gestantes não devem ser vacinadas.
- C) Podem vacinar-se, gratuitamente, indivíduos de 12 a 29 anos (duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias) e indivíduos entre 30 e 59 anos (uma dose).
- D) Aplicação por via intramuscular.

QUESTÃO 24

Rede de frios é o sistema de conservação das vacinas ou imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Engloba a produção até a administração dos mesmos, com o armazenamento, transporte e a manipulação destes produtos em condições adequadas de refrigeração. Em relação aos cuidados que devem ser adotados com a câmara refrigerada na sala de vacinação, é correto afirmar que:

- A) Deve ser instalada em local ventilado, caso não seja possível, manter a temperatura do ar condicionado da sala de vacinação entre 19° a 20° para que não ocorra o aquecimento do refrigerador.
- B) Nas unidades de saúde com pouca demanda de vacinas, a câmara refrigerada pode ser substituída por refrigerador de uso doméstico desde que mantenha a refrigeração ideal entre +2°C e +7°C.
- C) A leitura da temperatura deve ser feita apenas no início do turno de trabalho, pela manhã. A temperatura é lida e registrada em formulário, fixado na porta ou na face lateral da câmara refrigerada.
- D) A manutenção da temperatura das câmaras refrigeradas devem ser mantidas entre +2°C e +8°C, sendo a temperatura de controle set point +5°C.

QUESTÃO 25

No Brasil, o sarampo é uma doença imunoprevenível para a qual o Ministério da Saúde oferece vacinas para crianças e adultos. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde (2021), o programa de vacinação de crianças de 12 meses até menores de 5 anos de idade é:

- A) uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e uma dose da tetra viral aos 5 anos de idade.
- B) uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e uma dose da tetra viral aos 15 meses de idade.
- C) duas doses da vacina tríplice viral, com dois meses de intervalo entre as doses.
- D) duas doses da vacina tetra viral, com dois meses de intervalo entre as doses.

QUESTÃO 26

Na UBS utiliza-se Hipoclorito de Sódio a 0,5% para a desinfecção do material para inalação. Tem-se disponível este produto a 10% - 5 litros. Quanto devemos utilizar do mesmo para prepararmos 3 litros de solução a 0,5%?

- A) 250 ml.
- B) 150 ml.
- C) 300 ml.
- D) 15 ml.

QUESTÃO 27

O Planejamento Familiar ou planejamento reprodutivo pode ser entendido como:

- A) Direito de todo indivíduo decidir sobre sua geração, ter ou não ter filhos, quantos ter e quando tê-los, sem coação ou restrição de qualquer ordem.
- B) Ter conhecimento de todos os métodos contraceptivos disponíveis e as formas corretas de uso, bem como os efeitos colaterais e riscos pertinentes.
- C) É um conjunto de ações que visam fornecer aos indivíduos conhecimento para exercer a sua sexualidade e fertilidade, com responsabilidade e respeito ao outro (parceiro e possível filho gerado) de forma saudável, para realização de todos os envolvidos.
- D) É um conjunto de práticas que devem ser disponibilizadas aos indivíduos para lhes permitir o uso responsável de sua sexualidade e de sua fertilidade de forma a atender à previsão populacional de um País, Estado ou Município.

QUESTÃO 28

MLG, 51 anos, veio hoje para buscar o resultado do exame de Papanicolaou. No prontuário a enfermeira constata que seus dois últimos exames deram resultados negativos. O resultado do exame atual revela a presença de células escamosas na lâmina. A conduta correta neste caso é:

- A) Solicitar Mamografia e orientar para novo exame preventivo após um ano.
- B) Explicar à cliente que o exame deu negativo e aconselhar retorno anual.
- C) Orientar para novo exame preventivo após três anos e solicitar Mamografia.
- D) Orientar para retorno em um ano e indicar o auto-exame das mamas mensalmente.

QUESTÃO 29

A Pílula combinada, o método mais utilizado no mundo, contém dois tipos de hormônios: os derivados estrogênicos e os derivados progestínicos, em diferentes dosagens. Desde a década de 60, os laboratórios veem tentando o aperfeiçoamento das pílulas visando a obter uma

alta eficácia aliada a menores efeitos colaterais. Porém ainda há casos em que a contracepção hormonal é contra-indicada.

Aponte abaixo o enunciado que reúne as contraindicações absolutas para a pílula:

- A) Cardiopatia, problemas psíquicos, nuliparidade, antecedentes familiares de hipertensão.
- B) Tabagismo eventual, Diabetes, anemia, antecedentes de IST.
- C) Antecedentes de tromboembolismo e/ou de AVC, obesidade, idade > 40 anos, tabagismo.
- D) Doença celíaca, sobrepeso, gestações prematuras anteriores, Tipo sanguíneo Rh (-).

QUESTÃO 30

No dia 10/05/2021, durante uma consulta de enfermagem no pré-natal, o enfermeiro verifica a carteira de vacina da gestante A.P.M. de 16 semanas de gestação e identifica a seguinte situação:

Influenza: não há registro.

Febre amarela: não há registro.

Tríplice viral: 3 doses.

Hepatite B: uma dose em 02/04/2020.

Dupla Adulto (dT): três doses em 2016.

Contra Covid-19: 2 doses.

Assinale a alternativa que corresponde a recomendação do enfermeiro em relação a atualização vacinal para a gestante A.P.M., na data da consulta.

- A) Encaminhar para administração da segunda dose de Hepatite B, uma dose da dTpa e a dose de reforço da vacina contra COVID-19.
- B) Encaminhar para administração de uma dose de Influenza, a segunda dose da Hepatite B e a dose de reforço da vacina contra COVID-19 e marcar a dTpa para a 20ª semana.
- C) Encaminhar para administração de uma dose de Influenza e uma dose da dTpa. Orientar para a dose de reforço da vacina contra COVID-19 no puerpério.
- D) Encaminhar para administração de uma dose de reforço de dT e uma dose da Febre amarela.

QUESTÃO 31

Uma vez diagnosticada a Sífilis congênita, além dos exames laboratoriais não treponêmicos (VDRL), a criança deverá ser acompanhada com os seguintes exames durante as consultas de puericultura na atenção básica:

- A) Avaliação neurológica, oftalmológica e cardiológica no 1º ano de vida.
- B) Avaliação odontológica, neurológica e audiológica aos 2 anos.
- C) Avaliação oftalmológica, sanguínea e neurológica semestral até 2 anos.
- D) Avaliação neurológica, audiológica e oftalmológica semestral até 2 anos.

QUESTÃO 32

Um paciente de 5 anos de idade foi encontrado pela enfermeira não responsivo e sem apresentar respiração em uma unidade de pediatria de um hospital geral. A enfermeira tentou, durante 10 segundos, detectar o pulso carotídeo, sem sucesso. Por ter sido treinada segundo as diretrizes de 2020 da American Heart Association (AHA), identificou que esse paciente estava em parada cardiorrespiratória e, assim, iniciou os procedimentos de assistência a seguir:

1. Solicitou chamada do médico.
2. Observou obstrução de vias aéreas.
3. Iniciou compressão torácica.
4. Iniciou ventilação.

Assinale a opção que apresenta a ordem correta os procedimentos realizados.

- A) 1 - 2 - 4 - 3.
- B) 1 - 3 - 2 - 4.
- C) 1 - 3 - 4 - 2.
- D) 2 - 4 - 3 - 1.

QUESTÃO 33

O risco de quedas de pessoas idosas no ambiente hospitalar está associado a fatores de risco vinculados tanto ao indivíduo quanto ao ambiente físico. Um enfermeiro do setor de internação, ao admitir um paciente do sexo masculino, de 85 anos, internado para tratamento de diabetes mellitus, em uso de agentes antidiabéticos, diuréticos, antipsicóticos e antidepressivos tricíclicos, relatou

diminuição da acuidade visual, incontinência urinária e inatividade física. Ao exame físico, observou desequilíbrio postural, manchas arroxeadas nos braços e na região do tórax, além de condições higiênicas precárias. Como o perfil do paciente se enquadrava em idosos com risco de queda, o enfermeiro utilizou o protocolo de avaliação de risco padronizado pela instituição.

Nessa situação, os fatores de risco apresentados pelo paciente são caracterizados apenas como:

- A) intrínsecos e comportamentais.
- B) intrínsecos e extrínsecos.
- C) comportamentais e extrínsecos.
- D) intrínsecos.

QUESTÃO 34

Considere um projeto de pesquisa envolvendo crianças de 5 a 10 anos de idade, internadas em uma clínica de pediatria cujo objetivo seja identificar o sentimento de medo diante do procedimento de punção venosa. Com base na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres humanos, avalie as afirmações a seguir quanto aos procedimentos a serem adotados pelo pesquisador.

- I. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) deverá ser assinado pela criança e ratificado por seu representante legal.
- II. O TCLE deve ser elaborado em duas vias: uma ficará com o sujeito da pesquisa ou com seu representante legal, e a outra será arquivada pelo pesquisador.
- III. Uma vez assinado o TCLE, a entrevista não poderá mais ser suspensa.
- IV. O pesquisador deve garantir o sigilo da privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa.
- V. Uma vez que o projeto for encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, as entrevistas podem ser iniciadas, mediante a assinatura do TCLE pelo representante legal da criança.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) II e IV.
- B) III e V.
- C) I, II e IV.
- D) I, II, III e V.

QUESTÃO 35

Higiene das mãos é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de microrganismos e evitar que pacientes e profissionais adquiram infecções relacionadas à assistência à saúde. Em 2009, a Organização Mundial Saúde lançou manual sobre a higienização das mãos nos vários cenários da assistência à saúde. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. Brasília, 2013 (adaptado). Considerando a semiótica da higienização das mãos e as diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir.

- I. A higienização das mãos engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica com preparação alcoólica e antisepsia cirúrgica.
- II. A preparação alcoólica para a higienização das mãos pode apresentar-se sob a forma líquida, contendo álcool na concentração de 50% a 70%, e sob a forma de gel e espumas, com álcool na concentração mínima de 70%.
- III. Os cinco momentos para a higienização das mãos são: antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimentos; após situações que envolvam o risco de exposição a fluidos corporais do paciente; após tocar o paciente; e após tocar superfícies próximas a ele.
- IV. Para a higienização simples das mãos em local onde haja possibilidade de exposição a agente biológico, deve haver um lavatório exclusivo provido de água corrente, sabão líquido, toalha descartável ou de tecido e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e IV.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 36

A adaptação à mudança de hábitos intestinais e os novos cuidados de higiene são dificuldades a serem enfrentadas pelos pacientes submetidos à colostomia. Após o procedimento cirúrgico, o acompanhamento e o incentivo do enfermeiro são imprescindíveis para que o paciente e sua família aceitem a nova realidade e recebam as orientações necessárias às práticas relacionadas ao autocuidado. Considerando os cuidados necessários à promoção da saúde do paciente submetido a esse procedimento cirúrgico, avalie as afirmações a seguir.

- I. É necessário observar rotineiramente o estoma, no que se refere à cor, brilho, umidade, tamanho, forma, localização, tipo e drenagem, e cuidar das condições da pele perilesional.
- II. O enfermeiro deve verificar o tipo de bolsa mais adequado ao caso e mostrar interesse em ajudar o paciente e seus familiares, por meio do esclarecimento de dúvidas e da orientação quanto aos procedimentos com a ostomia, de acordo com a evolução do paciente.
- III. O medo de sangramento e dor podem causar sentimentos negativos no paciente, por isso o enfermeiro deve manusear a bolsa de colostomia nos primeiros momentos.
- IV. As bolsas de colostomia adequadas apresentam diâmetro correspondente ao estoma para que não ocorram compressão e necrose do local, evitando-se, assim, trocas e risco de lesão na pele.
- V. A segurança e a intimidade do paciente devem ser preservadas, e a sua autonomia estimulada, evitando-se que os familiares participem das primeiras trocas de bolsa.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e V.
- D) III, IV e V.

QUESTÃO 37

O enfermeiro (a) responsável do Centro de Material e Esterilização (CME), realizará um treinamento com sua equipe sobre biossegurança na CME. Assinale a resposta correta em relação aos temas que deverão ser abordados com a equipe que atua nessa unidade:

- A) Ergonomia; Equipamento de proteção individual (EPI); Descarte de materiais; Laser; Riscos elétricos e de incêndio; líquidos voláteis, estresse e Burnout.
- B) Quimioterápicos; Equipamento de proteção individual (EPI); Descarte de materiais; Preparação para situações de emergência e catástrofes, riscos elétricos e de incêndios, Raio-X, estresse e Bornout.
- C) Ergonomia; Equipamento de proteção individual (EPI); Descarte de materiais; Preparação para situação de emergências e catástrofe, riscos elétricos e de incêndio, líquidos voláteis, estresse e Bournout.
- D) Quimioterápicos; Equipamento de proteção individual (EPI); Laser; Preparação para situação de emergência e catástrofes, riscos elétricos e de incêndio, Raio X, estresse e Burnout.

QUESTÃO 38

Estabelecer o quadro quantiquantitativo de profissionais necessários para a prestação da Assistência de Enfermagem é de competência do enfermeiro. O dimensionamento e a adequação do quadro devem basear-se em características relativas a:

- A) Serviço de Enfermagem, ao Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e as Decisões do COREN.
- B) Instituição, à clientela e ao sistema de classificação de pacientes.
- C) Modelo gerencial, ao modelo assistencial e aos padrões de desempenho dos profissionais de Enfermagem.
- D) Instituição/empresa, ao Serviço de Enfermagem e à Clientela.

QUESTÃO 39

A Lei Federal nº 11.104/2005 instituiu a obrigatoriedade de Brinquedoteca Hospitalar. Dados da Associação Internacional pelo Direito de Brincar apontam que crianças hospitalizadas que usam a brinquedoteca se recuperam 20% mais rápido que as que não têm acesso a esse tipo de estrutura. Há onze anos tornou-se obrigatório que os hospitais que oferecem atendimento pediátrico, em regime de internação, tenham brinquedotecas. Das colocações, abaixo, assinalar a (s) **falsa** (s):

- I- Os objetivos são estabelecer relações de um bem-estar e acolhimento para com a criança.
- II- Espaço de bem-estar e deve priorizar o brincar livre e espontâneo, fazendo com que as crianças se sintam felizes e relaxadas.
- III- Crianças com problemas de comportamentos inadequados estarão impedidas de frequentar o local.
- IV- Os profissionais de recreação, os brinquedistas e educadores, não necessitam de capacitação para exercer essas atividades.

- A) I - II
- B) III - IV
- C) II - III
- D) II - IV

QUESTÃO 40

Mãe de Lactente, de dois meses, relata que seu filho apresenta regurgitações várias vezes ao dia, irritabilidade, e má aceitação da dieta. Amamentou por menos de um mês, atualmente vem sendo alimentado com fórmula infantil. Peso de nascimento: 3 Kg e comprimento: 50 cm. Relata que mantém o RN em posição vertical por 20 a 30 minutos após a mamada e durante o sono o lactente é mantido em posição prona com a cabeça elevada. Peso atual: 5,2 Kg. Evacuações normais. Devemos orientar a mãe a manter o lactente, durante o sono, na seguinte posição:

- A) posição supina, com elevação da cabeceira a 30-40 graus.
- B) posição prona, durante o sono, com elevação da cabeceira.
- C) posição prona que vem sendo adotada e oferecer dieta engrossada.
- D) evitar o decúbito dorsal, porque associa-se com maior risco de ocorrência de morte súbita.



Nucvest
vestibulares e concursos



FUNDAÇÃO SÃO PAULO

**Núcleo de Vestibulares e Concursos
da
Fundação São Paulo**