



O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.

Instruções

- A duração da prova é de 2 horas e meia, devendo o candidato permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora e meia.
- A prova contém 40 questões objetivas, cada uma com quatro respostas, das quais apenas uma é correta, sobre temas da área de pré-requisito.
- Assinale na folha óptica de respostas a alternativa que julgar correta, preenchendo com caneta esferográfica (azul ou preta), com traço forte, dentro do espaço. Evite amassar e rasurar.
- Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta assinalada na folha óptica. Também não serão computadas aquelas respostas com emenda ou rasura, ainda que legíveis, assinaladas com traço fraco ou em branco.
- Desligue o celular, similares e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e coloque-os no envelope designado para este fim.
- Não é permitido o uso de relógio, seja digital, seja analógico, com calculadoras ou outros recursos. Coloque-o no envelope também.
- Será excluído da seleção o candidato que lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova.
- Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o caderno de questões e a folha óptica de respostas.

Boa prova!

• Questão 01 •

A educação popular em saúde toma como ponto de partida os saberes prévios dos educandos. Posto isso é **correto** afirmar:

- a) Os educandos escolhem os locais para o desenvolvimento das atividades educativas em saúde.
- b) Há uma relação de troca de saberes entre o saber popular e o científico, em que ambos têm a enriquecer reciprocamente.
- c) Há grandes conexões que permitem o desenvolvimento de relações educativas entre os trabalhadores de saúde e a população.
- d) É importante pensar a educação popular em saúde como um recurso estratégico, que potencializa a conscientização da população sobre suas condições de vida.

• Questão 02 •

As Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para:

- a) Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS.
- b) Determinar os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- c) Definir protocolo clínico e diretriz terapêutica.
- d) Definir as regras da gestão compartilhada do SUS.

• Questão 03 •

No processo de trabalho dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), o foco é o território sob sua responsabilidade e a estrutura prioriza o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, o que gera experiência para todos os profissionais envolvidos, mediante metodologias, como estudo e discussão de casos e situações, projetos terapêuticos, orientações e atendimento conjunto. Considerando a perspectiva de Apoio Matricial (AM) na qual se fundamenta o NASF, avalie as afirmações a seguir:

- I. O Apoio Matricial contribui na organização de uma linha de cuidado contínua, rompendo com a fragmentação do cuidado.
- II. No Apoio Matricial, a resolução dos problemas está pautada na dimensão assistencial, que se origina a partir de uma ação indireta com os usuários, e na técnico-pedagógica, que gera uma ação e apoio educativo com e para a equipe.
- III. Pelo Apoio Matricial, o NASF se constitui porta de entrada do sistema para os usuários e apoio às equipes de Saúde da Família em territórios definidos.
- IV. O Apoio Matricial assegura a retaguarda especializada à equipe e aos profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde na Estratégia Saúde da Família (ESF).

É **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.

• Questão 04 •

Para a equipe de saúde, o reconhecimento do território tem a finalidade de:

- a) Identificar os elementos constitutivos da reprodução da vida social nos diversos lugares.
- b) Analisar a situação de saúde de uma coletividade, planejar e promover as soluções possíveis.
- c) Identificar problemas de saúde nos espaços geográficos.
- d) Determinar vulnerabilidades para a saúde humana, originadas nas interações de grupos sociais em determinados espaços geográficos.

• Questão 05 •

O relacionamento terapêutico é uma tecnologia que a enfermagem usa como ferramenta para permitir o cuidado de qualidade. Ela se constitui por:

- a) Permitir o entendimento das experiências de vida do paciente.
- b) Estimular o paciente a participar da tomada das decisões terapêuticas.
- c) Reconhecer o paciente e o enfermeiro enquanto seres humanos dotados de saberes próprios.
- d) Considerar os itens a), b) e c) acima associados a uma boa compreensão da linguagem não verbal.

• Questão 06 •

A leitura crítica de artigos científicos é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento acadêmico e profissional. Qual das opções abaixo melhor descreve o propósito dessa prática?

- a) Avaliar a quantidade de referências bibliográficas e a estética visual dos gráficos, considerando isso como um critério primário de qualidade.
- b) Identificar inconsistências de gramática e ortografia, pois esses fatores determinam a credibilidade de um artigo científico.
- c) Realizar uma análise detalhada do artigo científico, considerando a validade dos dados, a robustez da metodologia, e a coerência entre resultados e conclusões, com o objetivo de formar um julgamento crítico e fundamentado sobre o tema e sua relevância na área de estudo.
- d) Ler de forma rápida e superficial, priorizando a economia de tempo sobre a compreensão aprofundada dos argumentos e da metodologia científica.

• Questão 07 •

O método auscultatório é especialmente importante no exame físico de enfermagem do paciente com pós-operatório em cirurgias abdominais. Está **correto afirmar:**

- a) Deve ser realizado, quando no abdome, a partir da FID, onde normalmente deve existir ruídos hidroaéreos.
- b) Os resultados dessa ausculta devem apontar para o silêncio dos ruídos hidroaéreos nas primeiras horas do pós-operatório.
- c) A ausculta deve preceder as demais técnicas propedêuticas a serem utilizadas.
- d) Os ruídos hidroaéreos devem ser identificados em qualquer quadrante abdominal no pós-operatório imediato.

• Questão 08 •

Durante uma expedição, um grupo de estudantes se perdeu de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Conseqüentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação o sistema excretor dos estudantes:

- a) Aumentou a filtração glomerular pelo aumento do ADH.
- b) Produziu maior volume de urina pela redução do ADH.
- c) Produziu urina com menos ureia.
- d) Produziu urina com maior concentração de cloreto de sódio.

• Questão 09 •

É indispensável uma abordagem multidisciplinar para o acompanhamento dos pacientes diabéticos, voltada principalmente para continuidade do tratamento em longo prazo e orientação. As hospitalizações causadas por pé diabético são prolongadas e recorrentes, exigindo grande número de consultas ambulatoriais e necessidade de cuidado domiciliar. A respeito do paciente diabético e de sua assistência, podemos afirmar que:

- I. São fatores de risco para o desenvolvimento de úlceras nos pés do paciente diabético: neuropatia periférica, anormalidade estrutural do pé, limitação da mobilidade articular e claudicação intermitente.
- II. Casos de pés diabéticos estão associados geralmente a pequenos traumas originados por uso de calçados impróprios, dermatoses comuns, manipulações incorretas dos pés ou unhas.
- III. A neuropatia periférica constitui-se na causa mais comum dos casos de pé diabético, conduzindo à lesão, podendo comprometer as fibras sensitivas, as motoras e as autonômicas.
- IV. A neuropatia periférica, quando se instala, é reversível, por isso é importante que os pacientes diabéticos mantenham o controle glicêmico e retomem seu tratamento quando apresentarem hiperglicemia.

- a) As alternativas I, II e IV estão corretas.
- b) As alternativas II, III e IV estão corretas.
- c) As alternativas I, III e IV estão corretas.
- d) As alternativas I, II e III estão corretas.

• Questão 10 •

A neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes, compreendendo um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximais ou distais, de instalação aguda ou crônica, de caráter reversível ou irreversível, manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos dramáticos. Em relação a isso assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Para avaliação da perda da sensibilidade protetora recomenda-se o teste com o monofilamento de 10 g e o teste com diapasão clínico de 128 Hz devido a sua alta eficácia e baixo custo.
- b) O seguimento de uma dieta adequada deve ser incentivado.
- c) A avaliação vascular periférica com a palpação dos pulsos tibiais posteriores e pediosos é fundamental para direcionar as intervenções e avaliar o prognóstico das lesões.
- d) A manutenção da higiene e secagem cuidados dos pés incluindo os espaços interdigitais, bem como, corte reto das unhas são ações de autocuidado que deve ser incentivado.

• Questão 11 •

Sobre o processo de rastreamento e diagnóstico da hipertensão arterial, analise as afirmações a seguir:

- I. A presença de sintomas deve ser considerada como fator decisivo para a adoção de conduta, pois o indivíduo assintomático sem fatores de riscos presentes provavelmente não é hipertenso.
- II. A primeira verificação deve ser realizada especificamente no braço esquerdo e esse braço deve ser utilizado como referência nas próximas medidas.
- III. A presença ou não de sintomas não deve ser considerada como fator decisivo para a adoção de conduta, ou seja, mesmo indivíduo assintomático e com inúmeros fatores de riscos presentes deve ter seu risco definido e, a partir do grau, ter seu acompanhamento estabelecido.
- IV. O seguimento do hipertenso não deve estar apenas vinculado com a medida da pressão, devendo-se sempre avaliar os fatores de risco. Mais importante que o diagnóstico de hipertensão é a somatória dos fatores de risco e sua interação, ou seja, a avaliação global do risco cardiovascular.

Estão **corretas** as afirmativas

- a) I e III. b) I e II. c) III e IV. d) II e IV.

• Questão 12 •

Em relação às ações do Enfermeiro no atendimento ao paciente hipertenso assinale verdadeiro (V) ou falso (F), e em seguida assinale a alternativa **correta**.

- () A consulta de enfermagem deve focar nos fatores de risco modificáveis.
- () As estratégias devem ser planejadas para promover e avaliar a adesão dos pacientes às condutas prescritas com técnicas educacionais, motivacionais, cognitivas e uso das tecnologias.
- () As visitas domiciliares devem ser direcionadas para o encorajamento ao autocuidado e incentivo ao usuário a criar rotinas e hábitos para a tomada da medicação.
- () O enfermeiro deve encaminhar para atendimento médico os usuários inscritos no Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto (PAISA) para a dispensação de medicamentos.

- a) V - V - F - F. b) V - F - V - F. c) F - V - F - V. d) V - V - V - F.

• Questão 13 •

O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) compreende, **exceto**:

- a) Aumentar a cobertura e a concentração do atendimento pré-natal, proporcionando iguais oportunidades de utilização do serviço para toda a população.
- b) Respeitar o número de filhos que cada mulher deseja ter e somente prevenir gravidez indesejada ou precoce se houver solicitação da mulher, família ou parceiro.
- c) Ampliar atividades de identificação e controle do câncer cérvico-uterino e de mamas.
- d) Implantar e/ou ampliar atividades de identificação e controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis.

• Questão 14 •

Você é enfermeiro(a) do acolhimento e recebe Cássia, 15 anos, que faz uso regular de anticoncepcional oral combinado e refere que teve relação sexual com o namorado no dia anterior e quando foi tomar a pílula viu que havia esquecido de tomar por três dias seguidos. Você a orienta:

- a) Tomar uma pílula assim que se notar o esquecimento.
- b) Tomar uma pílula de imediato e tomar a pílula seguinte no horário regular.
- c) Tomar uma pílula do dia seguinte e continuar a tomar a cartela restante regularmente.
- d) Tomar uma pílula de imediato e utilizar outro método contraceptivo de apoio por sete dias.

• Questão 15 •

Os anticoncepcionais orais combinados contêm dois hormônios sintéticos, o estrogênio e o progestogênio, semelhantes aos produzidos pelo ovário da mulher. Seu mecanismo de ação é:

- a) Não permitir que os espermatozoides e os microorganismos contidos no sêmen entrem em contato com a vagina.
- b) Impedir a penetração dos espermatozoides no útero e trompas.
- c) Inibir a ovulação e tornar o muco cervical espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides.
- d) Destruir ou imobilizar os espermatozoides, inativando as enzimas necessárias para a penetração no óvulo.

• Questão 16 •

Sobre a candidíase vulvovaginal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- () É uma infecção causada por um fungo cuja principal forma de transmissão é sexual (o risco de transmissão por ato sexual é de 60% a 80%) e que infecta a vagina e a uretra.
- () A gestação predispõe o aparecimento de candidíase vaginal e dentre os sintomas estão: prurido, corrimento branco, grumoso e inodoro e dispareunia.
- () O tratamento da candidíase vulvovaginal deve ser realizado preferencialmente com medicação por via oral, sendo indicado fluconazol 150 mg em dose única.
- () O microrganismo pode fazer parte da flora endógena em até 50% das mulheres.

- a) V - V - F - F.
- b) F - V - F - V.
- c) V - F - V - F.
- d) F - F - V - V.

• Questão 17 •

A maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre em casa. No Brasil, no período entre 2015 e 2021 foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, sendo 83.571 (41,2%) em crianças e 119.377(58,8%) em adolescentes. Mais da metade dos casos notificados de violência sexual foram de estupro, tanto em meninas quanto em meninos. Mais de um terço dos casos de violência sexual já havia ocorrido outras vezes e a maioria dos casos ocorreu na residência (Boletim Epidemiológico | Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ministério da Saúde, Volume 54, n.º 8, 29 fev. 2024). Para o atendimento à criança e ao adolescente vitimizados, o enfermeiro deve:

- Identificar comportamento autodestrutivo, ansiedade, baixa autoestima, uso de álcool e de outras drogas como efeitos a curto prazo da violência.
- Estar alerta aos sinais de violência apresentados pela criança e pelo adolescente, resguardando o sigilo profissional, revelando-o apenas à autoridade competente, quando se tratar de maus-tratos.
- Investigar ansiedade, dispersão, dificuldade de concentração, baixo rendimento escolar como principais efeitos do abuso sexual em escolares.
- Reconhecer que as lesões no esqueleto e no sistema nervoso central são mais comumente identificadas em crianças e adolescentes vitimizados por maus-tratos físicos.

• Questão 18 •

A lesão por pressão é um evento adverso e a sua prevenção é considerada meta de segurança do paciente e responsabilidade da equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção do sistema de saúde. Sobre as medidas para prevenção de lesão ou úlcera por pressão, considere as seguintes orientações propostas pelo Ministério da Saúde.

- Os calcâneos devem ser mantidos afastados da superfície da cama (livres de pressão) mantendo a hiperextensão do joelho e a pressão sobre o tendão de Aquiles.
- Realizar mudança de decúbito ou reposicionamento do paciente a cada duas horas ou de acordo com variáveis relacionadas ao indivíduo (tolerância tecidual, nível de atividade e mobilidade, condição clínica global, objetivo do tratamento, condição individual da pele, dor e pelas superfícies de redistribuição de pressão em uso) para reduzir a pressão local.
- Durante a hidratação da pele, áreas de proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas precisam ser massageadas. No entanto, a aplicação de hidratante não deve ser realizada, pois pode aumentar a exposição à umidade excessiva e favorecer o desenvolvimento de úlcera.
- Durante a admissão ou a readmissão do paciente, examine a pele cuidadosamente para identificar alterações da integridade cutânea e úlceras por pressão existentes. Para uma apropriada inspeção da pele, deve-se ter especial atenção às áreas corporais de maior risco: as regiões corporais submetidas à pressão por dispositivos (cateteres, tubos e dreno) e as regiões anatômicas sacral, calcâneo, ísquio, trocanter, occipital, escapular e maleolar.

Dentre as orientações, estão **corretas**:

- I e II.
- I e III.
- II e IV.
- III e IV.

• Questão 19 •

A tuberculose persiste como importante e desafiador problema no âmbito da saúde da população, contribuindo para manutenção do quadro de desigualdade e exclusão social em diversos países. É uma das enfermidades mais prevalentes entre as pessoas em situação de pobreza no mundo com elevada carga em termos de mortalidade.

O exame prioritário para o diagnóstico da tuberculose pulmonar é o(a):

- a) Prova tuberculínica.
- b) Baciloscopia direta de escarro.
- c) Exame radiológico simples.
- d) Baciloscopia de lavado brônquico.

• Questão 20 •

A vacinação é a melhor maneira de proteger o adolescente contra doenças imunopreveníveis. Na rede pública de saúde, em situação de rotina, especificamente na faixa etária dos 11 aos 14 anos, são disponibilizadas as seguintes vacinas:

- a) Tríplice viral e HPV.
- b) Tríplice Bacteriana e Meningocócica C.
- c) Hepatite B e BCG.
- d) Meningocócica ACWY e HPV.

• Questão 21 •

Sobre a vacina rotavírus humano (VRH) é **incorreto** afirmar:

- a) Não repetir a dose se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação.
- b) Está contraindicada para crianças com histórico de invaginação intestinal ou com malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal.
- c) Crianças com quadro agudo de gastroenterite (vômitos, diarreia, febre), podem ser vacinadas.
- d) Crianças com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas mediante prescrição médica.

• Questão 22 •

A pesquisa de campo é uma importante ferramenta no desenvolvimento da ciência da enfermagem, especialmente no aprimoramento das práticas assistenciais. Qual das seguintes opções reflete a principal contribuição da pesquisa de campo para a enfermagem?

- a) Permitir que os profissionais de enfermagem tomem decisões clínicas baseadas exclusivamente em teorias preexistentes, sem necessidade de comprovação prática.
- b) Facilitar a coleta de dados diretamente em ambientes controlados, longe da realidade prática dos pacientes e profissionais de saúde.
- c) Proporcionar aos profissionais de enfermagem a oportunidade de coletar dados diretamente do ambiente de atuação, permitindo uma melhor compreensão das necessidades e condições reais dos pacientes.
- d) Reduzir a importância do contato direto com pacientes, focando principalmente em análises laboratoriais e experimentais.

• Questão 23 •

Considerando que a mulher no pós-parto corre maior risco de tromboflebite e de aparecimento posterior de trombos, cabe ao enfermeiro uma avaliação direta para a detecção precoce desses problemas. Avalie as afirmativas e responda Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () Examinar a porção superior das pernas da cliente em busca de áreas avermelhadas, edema ou calor, indicativos de início de tromboflebite.
- () Relato de dor e de um desconforto leve nos membros inferiores são indicativos de sinal de Homans positivo.
- () Sinal de Homans: dor na panturrilha durante a dorsiflexão do pé sobre a perna.
- () Sinal de Bandeira: ao mobilizar as duas panturrilhas, a acometida apresenta menor mobilidade.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- c) F – V – F – V.
- d) F – F – V – V.

• Questão 24 •

O quarto estágio do parto inicia-se após a dequitação da placenta e estende-se pelas primeiras horas do pós-parto. Nesse período, é importante o cuidado de enfermagem na observação e no controle das hemorragias, muito comuns no pós-parto imediato. Considerando-se esse contexto, assinale a opção que apresenta o(s) cuidado(s) de enfermagem que evita(m) a hemorragia e suas complicações:

- a) Incentivo à amamentação e enfaixamento abdominal.
- b) Manutenção da parturiente com hidratação venosa durante todo o trabalho de parto.
- c) Suplementação alimentar com sulfato ferroso nas principais refeições e repouso no leito.
- d) Avaliação da presença do globo de segurança de Pinard e manutenção da contração uterina.

• Questão 25 •

Um homem com 75 anos de idade foi admitido em um hospital universitário, com sinais e sintomas de afasia e hemiplegia esquerda, sendo encaminhado para a unidade de internação clínica com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEi). Na unidade, a enfermeira o admitiu e realizou a anamnese. Após 72 horas de internação, o paciente encontrava-se consciente, acamado, respondendo a estímulos verbais simples e com descontrole dos estímulos de micção; apresentava sinais vitais dentro dos padrões de normalidade, exceto a temperatura, aferida em 38,7 °C. Encontrava-se com cateter vesical de demora funcionando, com diurese concentrada e precipitada no sistema coletor e hidratação venosa periférica em membro superior direito. Considerando as informações do caso clínico apresentado, avalie as afirmações a seguir.

- I. A infecção urinária é uma das complicações mais comuns em pessoas idosas internadas e costuma ocorrer devido à gravidade do estado dos pacientes, à diversidade microbiana e à exposição a procedimentos invasivos, como o cateterismo vesical.
- II. A troca do cateter vesical e do sistema de drenagem deve ser realizada mediante a alteração de exame laboratorial, duas vezes por semana ou caso haja colapamento do cateter urinário ou vazamento no sistema.
- III. O descontrole dos estímulos de micção deve-se à atonia vesical decorrente de problemas neurológicos como AVE, demência, doenças do neurônio motor, entre outras, que acarretam esvaziamento incompleto da bexiga, aumento do resíduo urinário, refluxo uretérico e bacteriúria.
- IV. A combinação de fatores como a quebra da técnica asséptica, a baixa adesão à higienização das mãos, o uso do mesmo recipiente para desprezar a urina da bolsa de drenagem e a diminuição da atenção às medidas de prevenção e controle de infecção contribuem para a ocorrência de infecção hospitalar.
- V. O risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos é um dos diagnósticos de enfermagem possível no caso clínico descrito, sendo uma das medidas de prevenção desse risco, a manutenção do coletor de urina aberto, desconectando o sistema sempre que necessário.

É **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I, IV e V.
- d) II, III e V.

• Questão 26 •

C.E., 44 anos, sexo masculino, com diagnóstico de insuficiência renal crônica, está sendo submetido a hemodiálise ambulatorial há três meses. Uma vez que C.E. é portador de fístula arteriovenosa em membro superior esquerdo, o enfermeiro deve orientá-lo sobre os cuidados a serem observados em relação a essa forma de acesso, esclarecendo que:

- a) É contraindicada a higienização da área de punção com sabão antibacteriano no dia da hemodiálise.
- b) Deve palpar o pulso ou frêmito na fístula arteriovenosa várias vezes ao dia, para verificar se há fluxo sanguíneo.
- c) Não existem restrições para a coleta de sangue no membro em que se localiza o acesso venoso.
- d) Finalizada a sessão de hemodiálise, deve aplicar uma pressão intensa e contínua sobre a fístula, após a retirada da agulha, para evitar sangramento.

• Questão 27 •

O TIME OUT deve ser feito na sala em que a cirurgia, procedimento ou exame invasivo será realizado, antes do seu início. Neste momento, o enfermeiro confere com o médico e com o anestesista, em voz alta, determinados itens de verificação:

- I. Paciente certo: checagem da identificação do paciente quanto ao nome completo e número do prontuário;
- II. Procedimento certo: checagem no prontuário do procedimento agendado; Local certo: local da cirurgia demarcado de acordo com o procedimento agendado;
- III. Equipamentos, materiais e medicamentos certos em sala, conforme estabelecido pela equipe médica;
- IV. Contagem das compressas que foram usadas na cirurgia;
- V. Documentação certa: anamnese, exame físico, avaliação pré-anestésica e consentimentos preenchidos; exames complementares relevantes para o procedimento em sala.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Apenas I, II, III e V estão corretas.
- c) Apenas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas I e V estão corretas.

• Questão 28 •

O paciente deverá receber Penicilina Cristalina 3.600.000 UI EV. Temos frascos 5.000.000 UI. Utilizar 8 ml de AD. Qual a dose a ser administrada?

- a) 5,8 ml.
- b) 3,6 ml.
- c) 7,2 ml.
- d) 2,4 ml.

• Questão 29 •

A prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue que não apresente sinal de alarme e/ou choque e nem apresente sangramento espontâneo, e deverá ser repetida no acompanhamento clínico do paciente, apenas se previamente negativa. Em relação à prova do laço, assinale a alternativa **correta**.

- a) É difícil de fazer, não sendo realizada de rotina.
- b) É positiva, quando contadas 20 ou mais petéquias em adultos.
- c) Será considerada positiva, se houver mais de 10 petéquias em adultos e crianças.
- d) É frequentemente positiva nos casos de dengue leve e malária.

• Questão 30 •

De acordo com Brunner (2005, p. 668), o sistema de drenagem torácica é um procedimento médico realizado, em situações eletivas e de emergência, principalmente após cirurgias de tórax. É empregado para reexpandir o pulmão afetado e para remover o excesso de líquidos e de sangue. Pode também ser utilizado no tratamento de pneumotórax espontâneo e do trauma que resulta em pneumotórax. Sobre os cuidados de enfermagem adequados é **correto** afirmar:

- I. Assegurar que o equipo de drenagem não está dobrado, não está com alça e nem interfere nos movimentos do paciente.
 - II. Encorajar o paciente a assumir uma posição confortável, mantendo o bom alinhamento corporal, com o sistema de drenagem no mesmo nível do paciente.
 - III. Observar e relatar imediatamente a respiração rápida e superficial, cianose, enfisema subcutâneo e alteração significativa nos sinais vitais.
 - IV. Encorajar o paciente a respirar profundamente e a tossir em intervalos regulares, principalmente após analgesia.
 - V. Assegurar que o dreno esteja imerso no frasco coletor com nível de água esterilizada conforme especificações do fabricante.
- a) Todas as afirmativas acima estão corretas.
b) Todas as afirmativas acima estão incorretas.
c) Apenas a afirmativa II está incorreta.
d) Apenas a afirmativa IV está incorreta.

• Questão 31 •

Compreende-se por assistência imediata ao recém-nascido aquela prestada logo após o seu nascimento, isto é, nas duas primeiras horas que se seguem após o parto, no local onde está a mãe. Embora sejam procedimentos universais e obrigatórios, segundo normas da Organização Mundial da Saúde, os cuidados a serem prestados ao recém-nascido devem ser desenvolvidos segundo a ética profissional, a filosofia da instituição e os princípios de humanização do nascimento. Com base na assistência de enfermagem ao recém-nascido marque Verdadeiro (V) ou Falso (F), conforme as afirmações a seguir:

- () A análise do coto umbilical é importante para detectar anomalias do recém-nascido. Normalmente pesquisa-se a presença de duas veias e uma artéria.
- () A vitamina K é administrada em dose única por via intramuscular, logo após o nascimento, com o objetivo de prevenir a doença hemorrágica neonatal.
- () O contato pele-a-pele do recém-nascido com a mãe, na primeira meia hora após o nascimento, é importante pois contribui para o aumento da duração e prevalência da lactação, favorece a relação mãe/filho, a expulsão da placenta e a involução uterina.
- () O índice de Apgar deve ser realizado no primeiro e quinto minuto de vida do recém-nascido e é utilizado para avaliar a sua idade gestacional.
- () A credeização é realizada para fazer a profilaxia da oftalmia gonocócica.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

- a) V, V, V, V, F. b) V, V, V, F, V. c) F, V, V, F, V. d) F, V, F, V, F.

• Questão 32 •

A utilização do Diagnóstico de Enfermagem na prática de enfermagem consiste em mudar o foco do trabalho centrado na tarefa para o cuidado centrado nos problemas individuais dos pacientes assistidos. Nesse sentido, o documento da legislação do COFEN que determina a obrigatoriedade de desenvolver o processo de enfermagem nas instituições de saúde pública e privadas é:


- a) Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986.
- b) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- c) Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987.
- d) Resolução nº 736, de 17 de janeiro de 2024.

• Questão 33 •

As taxas de mortalidade infantil no Estado de São Paulo no período de 2000-2022, segundo componentes da mortalidade infantil: neonatal precoce, neonatal tardia e pós-neonatal, por mil nascidos vivos são apresentadas no gráfico abaixo:

Taxas de mortalidade infantil, segundo componentes

Estado de São Paulo, 2000-2022, por mil nascidos vivos



Fonte: SEADE

Considerando as informações do gráfico avalie as afirmações a seguir.

- I. Em 2022, a taxa de mortalidade infantil no Estado foi de 11,1 óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos.
- II. Em 23 anos, distinguem-se quatro momentos: queda paulatina entre 2000 e 2014; relativa estabilidade de 2015 a 2019; redução nos dois primeiros anos da pandemia; e em 2022 retorno aos níveis pré-pandêmicos.
- III. Nesse período a mortalidade infantil reduziu-se em 34%, com riscos decrescentes em todos os seus componentes e concentração de quase metade dos óbitos no grupo neonatal precoce (0 a 6 dias).
- IV. O componente neonatal é o indicador mais sensível a ações governamentais voltadas para o ambiente socioeconômico e a intersetorialidade. Dessa maneira, a melhoria no saneamento básico, na distribuição de renda e na oferta dos serviços de assistência à saúde tem maior impacto na redução desse componente.

Continua >>>

V. A mortalidade pós-neonatal é sensível a fatores endógenos e biológicos relacionados à gestação e ao parto, bem como à assistência de qualidade ao pré-natal, parto e puerpério. Sua redução envolve maior complexidade e custo.

É **correto** o que se afirma nas proposições:

- a) I, II e V, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) III e V, apenas.

• **Questão 34** •

As exacerbações asmáticas são responsáveis por grande parte do atendimento em departamentos de emergências, com altos custos diretos e indiretos como ausência dos pais ao trabalho e absenteísmo escolar. A enfermeira deve realizar uma breve história e exame físico devem ser conduzidos com o rápido início da terapia. Deve ser pesquisado:

- I. Tempo de início dos sintomas.
- II. Gravidade dos sintomas, incluindo limitação das atividades físicas e distúrbios de sono.
- III. Fatores desencadeantes de exacerbação asmática grave.
- IV. Todas as medicações sintomáticas e profiláticas em uso, incluindo doses e receitas, a adesão ao tratamento, mudanças de doses recentes e resposta à terapia instituída.
- V. Uso do SABA (broncodilatador adrenérgico de curta duração), mais que duas vezes por semana.

- a) Apenas I, IV, V estão corretos.
- b) Apenas IV está correto.
- c) Apenas I, III e V estão corretos.
- d) I, II, III, IV e V estão corretos.

• **Questão 35** •

Considerando o sistema de classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional, julgue as afirmativas:

- I. O diagnóstico de enfermagem com foco no problema será prioritário em relação a outro diagnóstico de risco em qualquer situação de atenção em saúde.
- II. Fatores de risco existem apenas em diagnósticos de risco, e fatores relacionados podem existir em diagnósticos com foco no problema e nas síndromes.
- III. A operacionalização do processo de enfermagem é possibilitada pela sistematização da assistência de enfermagem, que organiza o trabalho profissional.

Marque a alternativa adequada:

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) As afirmativas II e III estão corretas.


• Questão 36 •

O aleitamento materno é fundamental para a saúde e a qualidade de vida das crianças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o aleitamento materno exclusivo. Sobre isso pode-se afirmar:

- a) A criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões) ou sucos de frutas.
- b) A criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte.
- c) A criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
- d) A criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.

• Questão 37 •

No gráfico abaixo, aponte sequência **correta** dos eventos correspondentes aos números 1, 2 e 3.



- a) Sístole – sístole – sístole.
- b) Sístole - diástole – sístole.
- c) Diástole – sístole – diástole.
- d) Diástole – diástole – diástole.

• Questão 38 •

É **correto** afirmar que:

- a) A termorregulação é feita pela região pré-óptica do hipotálamo, hipófise e suprarrenais.
- b) A vasoconstrição é uma das consequências da resposta do organismo ao aumento do volume de sangue na periferia, durante os banhos gelados.
- c) Há uma relação indireta entre a volemia e o débito cardíaco.
- d) A taxa de cortisol se eleva em função do estímulo luminoso na retina e que é captado pelo núcleo supraquiasmático.

• Questão 39 •

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde ressalta o importante papel do enfermeiro no manejo dessas infecções. Em relação à sífilis, que é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na sífilis latente o diagnóstico é realizado exclusivamente por meio de testes imunológicos, pois não se observam sinais e sintomas clínicos.
- II. Na sífilis primária, após o contato sexual, a primeira manifestação é caracterizada por uma úlcera no local de entrada da bactéria, geralmente indolor acompanhada de linfonodos regionais. Pode desaparecer espontaneamente.
- III. Recomenda-se iniciar a investigação por um teste treponêmico, de preferência o teste rápido, devido à sua maior sensibilidade.
- IV. Após diagnóstico da sífilis e início do seu tratamento, o monitoramento do tratamento é por meio dos testes não treponêmicos.
- V. Pessoas que não sabem informar a existência de reação alérgica ao uso penicilinas não devem ser tratadas com benzilpenicilina benzatina.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.

• Questão 40 •

A padronização dos procedimentos de enfermagem é feita por meio de Protocolos e Procedimento Operacional Padrão (POP). Sobre isso assinale a alternativa **correta**:

- a) Expressa o planejamento do trabalho repetitivo garantindo que as ações sejam realizadas da mesma forma.
- b) Serve para o mapeamento e o monitoramento dos processos de trabalho.
- c) Garante a identificação e priorização de problemas e suas causas.
- d) Serve para garantir que as metas sejam alcançadas.

O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.



PUC-SP



FUNDAÇÃO SÃO PAULO

NucVest
vestibulares e concursos

www.nucvest.com.br